MaTeGnu

Mathematik mit Technologie an Grundvorstellungen orientiert nachhaltig unterrichten

Modul 2: Grundvorstellungen zum Integral

Jürgen Roth & Susanne Digel

09.11.2023 Videokonferenz

Didaktik der
Mathematik
Sekundarstufen

R

TU

P

Rheinland-Pfälzische
Technische Universität
Kaiserslautern
Landau

Modul 2: GV zum Integral

1. Grundvorstellungen zum Integral im Überblick ↪
2. Integrieren als Rekonstruieren ↪
3. Integrieren als Kumulieren ↪
4. Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts ↪
5. Integrieren als Mitteln ↪
6. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI) ↪
7. Grundvorstellungen vernetzen ↪

1

Grundvorstellungen zum Integral im Überblick

Anleitung

- Aneinanderreihen der Kennbuchstaben der richtigen Aussagen ergibt einen Lösungssatz auf sprachlich eher mäßigem Niveau.
- **Wichtig:** Bei jeder Frage sind mehrere richtige Antworten möglich.

Aufgabe 1

Was bedeutet die Aussage „ f ist auf $[a, b]$ integrierbar“?

- E** f ist im Intervall $[a, b]$ differenzierbar.
- K** f ist im Intervall $[a, b]$ stetig.
- O** f hat im Intervall $[a, b]$ eine Stammfunktion.
- M** Obersummengrenzwert = Untersummengrenzwert

Aufgabe 2

Unter welchen Bedingungen gilt folgendes?

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

- A** Es ist $a \leq b$ und $f(x) \leq g(x)$ auf $[a, b]$.
- Z** Es ist $a > b$ und $f(x) \leq g(x)$ auf $[a, b]$.
- D** Es ist $a < b$ und $f(x) \geq g(x)$ auf $[a, b]$.
- T** Es ist $a > b$ und $f(x) \geq g(x)$ auf $[a, b]$.

Aufgabe 3

f sein integrierbar.

Unter welchen Bedingungen gilt dann folgendes?

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^a f(x) dx$$

- H** Falls $f(x) \equiv 0$ auf $[a, b]$ ist.
- E** Falls $a = b$ ist.
- I** Falls f eine ungerade Funktion und $a = -b$ ist.
- T** Falls f eine gerade Funktion und $a = -b$ ist.

Aufgabe 4

f sein integrierbar und $a \neq 0$.

Unter welchen Bedingungen gilt dann folgendes?

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

- A** Falls $f(x) = x^2$ ist.
- Z** Falls $f(x) = \frac{1}{x}$ ist.
- S** Falls $f(x) \equiv 0$ ist.
- M** Falls f eine gerade Funktion ist.

Aufgabe 5

f sein integrierbar und $a > 0$.

Unter welchen Bedingungen gilt dann folgendes?

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$

- T** Falls $f(x) \equiv 0$ auf $[-a, a]$ ist.
- G** Falls f auf $[-a, a]$ eine gerade Funktion ist.
- O** Falls f auf $[-a, a]$ eine ungerade Funktion ist.
- E** Falls $f(x) = |x|$ auf $[-a, a]$ ist.

Aufgabe 6

Berechnen Sie

$$\int_L^I du$$

und ersetzen Sie das Fragezeichen in den roten Kästen jeweils durch den Buchstaben, der den Satz richtig vervollständigt.

ist der Minuend des Ergebnisses.

ist der Subtrahend des Ergebnisses.

Verständnisanker

- Ein Verständnisanker ist eine prototypische Situation, an der Grundvorstellungen und ein damit verbundener Erklärungskontext zu einem mathematischen Sachverhalt ausgebildet werden.
- Prototypisch meint, dass alle für das Verständnis des mathematischen Sachverhalts wesentlichen Strukturelemente in der Situation vorkommen und gedeutet werden können.
- Eine Situation eignet sich insbesondere dann als Verständnisanker, wenn sie leicht durchschaut werden kann.
- Lernende können in neuen Situationen, in der derselbe mathematische Sachverhalt eine Rolle spielt, auf den Verständnisanker zurückgreifen und, durch Analogiebildung zum Verständnisanker, passende Grundvorstellungen aktivieren.

Beispiel

- Ein möglicher **Verständnisanker** für Grundvorstellungen zum Integral ist die Frage nach der **Füllmenge eines Waschbeckens bei bekannter Zu- und Abflussgeschwindigkeit**.
- Anhand der Waschbeckensituation können die Grundvorstellungen „**Integrieren als Rekonstruieren**“ des Gesamteffekts und „**Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts**“ inhaltlich durchschaut werden.

Grundvorstellungen zum Integralbegriff

Rekonstruieren

Kumulieren

**Bestimmen eines
orientierten
Flächeninhalts**

Mitteln

Entwicklung des Integralbegriffs

2

Integrieren als Rekonstruieren

Grundvorstellung: Integrieren als Rekonstruieren

Verständnisanker: Waschbecken

In ein leeres
Waschbecken
wird 1 Minute lang
Wasser mit konstanter
Zuflussgeschwindigkeit
von 10 Litern pro Minute
eingelassen, dann die Wasserzufuhr
gestoppt und gleichzeitig der Abfluss
geöffnet, aus dem das Wasser mit
einer Abflussgeschwindigkeit von
5 Litern pro Minute abfließt. Nach
weiteren 1,5 Minuten wird der
Abfluss wieder geschlossen.

Frage

Wie lässt sich aus der Zufluss- bzw. Abfluss-
geschwindigkeit $V'(t)$ auf die Wassermenge $V(t)$
im Waschbecken zum Zeitpunkt t schließen?

Grundvorstellung: Integrieren als Rekonstruieren

Die Produkte $10 \cdot t$ und $5 \cdot (t - 1)$ können als **Flächeninhalte von Rechtecken** gedeutet werden. $V(t)$ ist die Summe vorzeichenbehafteter Flächeninhalte von Rechtecken, also ein **orientierter Flächeninhalt**.

$$V(t) = \begin{cases} 10 \cdot t & \text{für } 0 \leq t \leq 1 \\ 10 - 5 \cdot (t - 1) & \text{für } 1 < t \leq 2,5 \\ 2,5 & \text{für } t > 2,5 \end{cases}$$

Grundvorstellung: Integrieren als Rekonstruieren

Die Produkte $\frac{1}{2} \cdot t \cdot 10t$ und $5 \cdot (t - 1)$ können als **Flächeninhalte** eines Dreiecks bzw. eines Rechtecks gedeutet werden. $V(t)$ ist ein orientierter Flächeninhalt.

$$V(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot t \cdot 10t & \text{für } 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{1}{2} \cdot 10 - 5 \cdot (t - 1) & \text{für } t > 1 \end{cases}$$

Grundvorstellung: Integrieren als Rekonstruieren

Die Produkte $\frac{1}{2} \cdot t \cdot 10t$ und $5 \cdot (t - 1)$ können als **Flächeninhalte** eines Dreiecks bzw. eines Rechtecks gedeutet werden. $V(t)$ ist ein orientierter Flächeninhalt.

$$V(t) = \begin{cases} 5 + \frac{1}{2} \cdot t \cdot 10t & \text{für } 0 \leq t \leq 1 \\ 5 + \frac{1}{2} \cdot 10 - 5 \cdot (t - 1) & \text{für } t > 1 \end{cases}$$

Grundvorstellung: Integrieren als Rekonstruieren

Rückblick

- Aus der Zuflussgeschwindigkeit des Wassers zu jedem Zeitpunkt wurde die Wassermenge $V(t)$ zu jedem Zeitpunkt rekonstruiert.
- Die Zuflussgeschwindigkeit ist die (momentane) Änderungsrate der Wassermenge im Waschbecken.
- Aus der Änderungsrate wurde die Funktion V wiederhergestellt. [wiederherstellen = integrieren (lat.)]

Vorteile des Waschbecken-Beispiels

- Fokussiert auf die Grundvorstellung Integrieren als Rekonstruieren.
- Unterstützt die Grundvorstellung Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts.

Grundvorstellung

Integrieren als Rekonstruieren

Ein bestimmtes Integral rekonstruiert die Gesamtänderung einer Größe (den Gesamteffekt der Änderung) aus ihrer Änderungsrate.

Bemerkung

Der aktuelle Bestand ergibt sich aus dem rekonstruierten Gesamteffekt der Änderung und dem Anfangsbestand zu Beginn der betrachteten Änderungen.

Dürreproblematik in Spaniens Stauseen

<https://www.youtube.com/watch?v=OOSLxFvBAfk>

Von joan ggk - panta_sau_1_octubre_2005_038, CC BY 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2841770>

3

Integrieren als Kumulieren

Grundvorstellung: Integrieren als Kumulieren

Nichtlinearer Zufluss

Frage

Wie kann man den Gesamteffekt aus den Änderungsraten rekonstruieren, wenn der Zufluss bzw. Abfluss nichtlinear ist?

Idee

- Die Zuflussgeschwindigkeit ist bei genügend kleinen Zeitintervallen $[t, t + \Delta t]$ nahezu konstant.
- In jedem Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ kann man vorgehen, wie in der Abbildung dargestellt.

Was trägt V' im Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ zum Gesamteffekt bei?

- Da V' die momentane Änderungsrate von V ist, gilt für kleine Δt in guter Näherung:
$$V'(t) \approx \frac{\Delta V}{\Delta t} \text{ also } \Delta V \approx V'(t) \cdot \Delta t$$
- Dies ist der Zuwachs der Wassermenge im Zeitintervall Δt , geometrisch zu deuten als kleiner (orientierter) Rechteckinhalt.

Grundvorstellung: Integrieren als Kumulieren

Nichtlinearer Zufluss

Erkenntnis

- Zur Rekonstruktion der Wassermenge zu einem beliebigen Zeitpunkt t sind die Zuwächse über alle Teilintervalle zu summieren, in die das Intervall $[0; t]$ zerlegt wurde.
- Geometrisch gedeutet, ist der rekonstruierte Wert $V(t)$ die Summe aller dieser kleinen (orientierten) Rechteckinhalte.
- Diese unterscheidet sich bei genügend kleiner Streifenbreite beliebig wenig von dem (orientierten) Inhalt der Fläche unter dem Graph von V' .

Graph von $V'(t)$

Flächenbilanz
= 8.98

$n = 11$

Rechteckstreifen
Untersumme = 6.28

Graph von $V(t)$

anzeigen

Grundvorstellung: Integrieren als Kumulieren

Grundvorstellung Integrieren als Kumulieren

Ein bestimmtes Integral ist das Ergebnis des Aufsummierens kleiner Summanden mit Produktstruktur.

Definition (beliebige Zerlegungen des Intervalls) Ober- und Untersumme

Die Funktion f sei im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ definiert und beschränkt,

$$Z = [a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b]$$

sei eine Zerlegung des Intervalls $[a; b]$ sowie M_i das Supremum und m_i das Infimum der Funktionswerte im Teilintervall $[x_{i-1}, x_i]$. Dann heißen

$$\sum_{i=1}^n M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

die **Obersumme** und

$$\sum_{i=1}^n m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

die **Untersumme** von f zur Zerlegung Z .

Satz (Verfeinerung von Zerlegungen)

(1) Die Zerlegung Z_2 sei eine Verfeinerung der Zerlegung Z_1 , d.h. Z_2 enthält die Zerlegungsstellen von Z_1 und noch beliebig viele weitere.

Dann ist die

- Obersumme zu Z_2 kleiner als die oder höchstens gleich der Obersumme zu Z_1 ,
- Untersumme zu Z_2 größer als die oder höchstens gleich der Untersumme zu Z_1 .

(2) Das Supremum der Menge aller Untersummen ist kleiner als das oder höchstens gleich dem Infimum der Menge aller Obersummen.

Ober- und Untersumme

Infimum := größte untere Schranke
Supremum := kleinste obere Schranke

Definition (äquidistante Intervall-Zerlegungen) Ober- und Untersumme

Die Funktion f sei im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ definiert und beschränkt. Für ein $n \in \mathbb{N}$ wird das Intervall $[a; b]$ durch

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

mit $x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ für $i = 0, \dots, n$ in n gleich große Teile zerlegt.

M_i sei das Supremum und m_i das Infimum der Funktionswerte im Teilintervall $[x_{i-1}, x_i]$. Dann heißen

$$O_n = \sum_{i=1}^n M_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

die **Obersumme** und

$$U_n = \sum_{i=1}^n m_i \cdot (x_i - x_{i-1})$$

die **Untersumme** von f zu dieser Zerlegung.

Integralfunktion, Obersumme und Supremum

Bemerkungen

- Für die Integrierbarkeit reicht als Voraussetzung, an die Funktion f , dass sie in einem abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ beschränkt ist.
- Dann kann es bei nicht-stetigen Funktionen aber vorkommen, dass f in $[a; b]$ das **Maximum** (größter Funktionswert) und / oder **Minimum** (kleinster Funktionswert) nicht annimmt.
- Deswegen wird in der Definition der Integrierbarkeit das **Supremum** (kleinste obere Schranke für die Funktionswerte) bzw. das **Infimum** (größte untere Schranke für die Funktionswerte) genutzt.
- Da Funktionen, die in einem Intervall $[a; b]$ stetig oder monoton sind, dort ihr Maximum und Minimum auch annehmen, kann man für diese Funktionen das Maximum bzw. Minimum nutzen.

Definition (beliebige Intervall-Zerlegungen) Bestimmtes Integral & Integrierbarkeit

Die Funktion f sei im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ definiert und beschränkt.

Wenn das Supremum S aller über dem Intervall $[a; b]$ gebildeten Untersummen gleich dem Infimum I aller über dem Intervall $[a; b]$ gebildeten Obersummen ist, so heißt

- diese Zahl **bestimmtes Integral** von f über dem Intervall $[a; b]$, und wird mit $\int_a^b f(x) dx$ bezeichnet,
- die Funktion f **integrierbar** über dem Intervall $[a; b]$.

Definition (äquidistante Intervall-Zerlegungen) Bestimmtes Integral & Integrierbarkeit

Die Funktion f sei im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ definiert und beschränkt.

Wenn für eine äquidistante Zerlegung

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

von $[a; b]$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$, dann heißt

- diese Zahl **bestimmtes Integral** von f über dem Intervall $[a; b]$, und wird mit $\int_a^b f(x) dx$ bezeichnet:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$$

- die Funktion f **integrierbar** über dem Intervall $[a; b]$.

Bestimmtes Integral und Integrierbarkeit

Definition für Schülerinnen und Schüler

Definition: Bestimmtes Integral & Integrierbarkeit

Die Funktion f sei im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$ definiert und beschränkt. Für eine Zerlegung des Intervalls $[a; b]$ in $n \in \mathbb{N}$ gleichlange Teilintervalle der Länge $\frac{b-a}{n}$ sind

$m_1, \dots, m_n$ die **minimalen** und $M_1, \dots, M_n$ die **maximalen Funktionswerte** von f im Teilintervall 1, ... bzw. n . Dann heißen

■ $U_n = m_1 \cdot \frac{b-a}{n} + \dots + m_n \cdot \frac{b-a}{n}$ die **Untersumme**

■ $O_n = M_1 \cdot \frac{b-a}{n} + \dots + M_n \cdot \frac{b-a}{n}$ die **Obersumme**

von f zu dieser Zerlegung. Gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$, dann heißt

(1) diese Zahl **bestimmtes Integral** von f über dem Intervall $[a; b]$, und wird mit $\int_a^b f(x) dx$ bezeichnet:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n$$

(2) die Funktion f **integrierbar** über dem Intervall $[a; b]$.

Grundvorstellung: Integrieren als Kumulieren

MaTeGnu-Materialien

Definition (Integralfunktion)

Wenn eine Funktion f für alle $x \in [a; b]$ über $[a; x]$ integrierbar ist, so heißt

$$I_a: x \mapsto I_a(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{für } x \in [a; b]$$

Integralfunktion (zur Integrandenfunktion f mit der unteren Grenze a und der oberen Grenze x).

Für das triviale Integral gilt: $\int_a^a f(t) dt := 0$

Bemerkungen:

- Für die Integralfunktion $I_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ gilt:
Das bestimmte Integral $I_a(b) = \int_a^b f(t) dt$ ist der Funktionswert von $I_a(x)$ an der Stelle b .
- Es gilt: $\int_a^b f(x) dx \equiv \int_a^b f(t) dt$

Definition (Stammfunktion)

Eine im Definitionsbereich der Funktion f differenzierbare Funktion F mit $F' = f$
Stammfunktion von f .

Bemerkungen

- Eine **Stammfunktion** besitzen und **Integrierbarkeit** sind zwei verschiedene Eigenschaften einer Funktion.
- Es gibt Funktionen, die eine Stammfunktion besitzen, aber nicht integrierbar sind.
- Daneben gibt es Funktionen die integrierbar sind, aber keine Stammfunktion besitzen.

Beispiel: Stammfunktion $\rightarrow$ Integrierbarkeit?

$$F(x) = \begin{cases} x \cdot \sqrt{x} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

- Für die Funktionen F und f gilt: $F' = f$
- F ist also eine **Stammfunktion von f** .
- Da die Funktion f in der Nähe von 0 nicht beschränkt ist, ist f **nicht integrierbar**.
- Es gibt also Funktionen, die eine **Stammfunktion** besitzen, **aber nicht integrierbar** sind!

Beispiel: Integrierbarkeit → Stammfunktion?

- Die Funktion $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$ ist **integrierbar**.

- Das Integral von f über einem Intervall $[a; b]$ ist:

$$\int_a^b f(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{für } a \leq b \leq 0 \\ b & \text{für } a \leq 0 \leq b \\ a - b & \text{für } 0 \leq a \leq b \end{cases}$$

- Die Funktion f besitzt auf ganz $\mathbb{R}$ keine Stammfunktion, denn die Funktion F die als Stammfunktion in Frage käme, ist an der Stelle 0 nicht differenzierbar:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ x & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

- Es gibt also Funktionen, die **integrierbar** sind, aber keine **Stammfunktion** besitzen!

Grundvorstellung: Integrieren als Kumulieren

Satz (Existenz des Integrals)

Die Funktion f sein im abgeschlossenen Intervall $[a; b]$

- monoton wachsend (bzw. monoton fallend)
- oder
- stetig.

Dann ist die Funktion f auf $[a; b]$ beschränkt und integrierbar.

Bemerkung

Alle Erkenntnisse zu Ober- und Untersumme, Integrierbarkeit, Integral und Integralfunktion lassen sich direkt auf Volumenintegrale von Rotationskörpern anwenden!

4

Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts

Wert des Integrals $\int_a^b f(x) dx$

Durchschnittliche Lösungswahrscheinlichkeiten:

- International: 35%
- Deutschland: 23%
(Grundkurse: 18%; Leistungskurse: 36%)

- S_1 ist der Inhalt der Fläche, die vom Graphen G_f der Funktion f , von der x -Achse und der Geraden $x = a$ eingeschlossen wird.
- S_2 ist der Inhalt der Fläche, die vom Graphen G_f der Funktion f , von der x -Achse und der Geraden $x = b$ eingeschlossen wird.
- Es ist $a < b$ und $0 < S_2 < S_1$.
- Der Wert des Integrals $\int_a^b f(x) dx$ ist dann:
  - $S_1 + S_2$
  - $S_1 - S_2$
  - $S_2 - S_1$
  - $|S_1 - S_2|$
  - $\frac{1}{2} \cdot (S_1 + S_2)$

Grundvorstellung: Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts

Die Produkte $10 \cdot t$ und $5 \cdot (t - 1)$ können als **Flächeninhalte von Rechtecken** gedeutet werden. $V(t)$ ist die Summe vorzeichenbehafteter Flächeninhalte von Rechtecken, also ein **orientierter Flächeninhalt**.

Waschbecken

In ein leeres Waschbecken wird 1 Minute lang Wasser mit konstanter Zuflussgeschwindigkeit von 10 Litern pro Minute eingelassen, dann die Wasserzufuhr gestoppt und gleichzeitig der Abfluss geöffnet, aus dem das Wasser mit einer Abflussgeschwindigkeit von 5 Litern pro Minute abfließt. Nach weiteren 1,5 Minuten wird der Abfluss wieder geschlossen.

Grundvorstellung: Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts

Grundvorstellung Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts

Ein bestimmtes Integral ist eine Bilanz von Flächeninhalten.

$$I_a(x) = \int_a^x f(t) dt$$

= (Summe der Inhalte aller oberhalb der x -Achse liegenden Flächenstücke zwischen a und x)
– (Summe der Inhalte aller unterhalb der x -Achse liegenden Flächenstücke zwischen a und x)

Grundvorstellung: Integrieren als Bestimmen eines orientierten Flächeninhalts

Orientierter Flächeninhalt $\leftrightarrow$ Flächeninhalt

- Der **orientierte Flächeninhalt** der im Intervall $[a; x]$ vom Graph von f und der x -Achse eingeschlossenen Fläche beträgt $\int_a^x f(t) dt$.
- Der **Flächeninhalt** der im Intervall $[a; x]$ vom Graph der Funktion f und der x -Achse eingeschlossenen Fläche beträgt $\int_a^x |f(t)| dt$.

Satz (Integral-Additivität)

Es sei $c \in [a; b]$. Wenn die folgenden drei Integrale existieren, dann gilt:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Komplementarität: Flächeninhalt ↔ Integral

5

Integrieren als Mitteln

Grundvorstellung: Integrieren als Mitteln

Mittelwertbildung bei linearen Funktionen

Gesucht

- Mittelwert $f(x_0)$ einer linearen Funktion in einem Intervall $[a, b]$.
- Der Mittelwert wird in der Mitte des Intervalls angenommen.
- Der mittlere Funktionswert kann genutzt werden, um den Flächeninhalt $I_a(b)$ unter dem Graph von f als Rechteck zu realisieren.
- Damit gilt:
$$I_a(b) = (b - a) \cdot f(x_0)$$
- Für den Mittelwert $f(x_0)$ folgt:
$$f(x_0) = \frac{1}{b-a} \cdot I_a(b)$$

Inhaltlich als
Geschwindigkeits-
Zeit-Diagramm
deuten

Grundvorstellung: Integrieren als Mitteln

Gesucht: Mittelwert einer Messreihe aus n Messwerten $y_1, y_2, \dots, y_n$ zu äquidistanten Zeitpunkten $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ergebnis: Der gesuchte Mittelwert ist das arithmetische Mittel der Messwerte $y_1, y_2, \dots, y_n$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot (y_1 + \dots + y_n) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i.$$

- Messwerte werden als diskrete Realisierung eines stetigen Funktionsverlaufs f betrachtet.
- Algebraische Umformung des Terms für das arithmetische Mittel liefert:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n y_i = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i) = \frac{1}{b-a} \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \frac{b-a}{n} \\ &\approx \frac{1}{b-a} \cdot I_a(b) \end{aligned}$$

Grundvorstellung: Integrieren als Mitteln

Mittelwert einer Funktion f im Intervall $[a, b]$

Bemerkung

- Aus den Beispielen folgt, dass es sinnvoll ist, unter der Zahl

$$m_{[a;b]}(f) = \frac{1}{b-a} \cdot I_a(b)$$

den Mittelwert einer Funktion f im Intervall $[a; b]$ zu verstehen.

- Es gilt:

$$I_a(x) = \int_a^x f(t) dt$$

- Speziell:

$$I_a(b) = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$$

Grundvorstellung: Integrieren als Mitteln

Mittelwert einer Funktion f im Intervall $[a, b]$

Grundvorstellung Integrieren als Mitteln

Ein bestimmtes Integral mittelt die Funktionswerte der Integrandenfunktion im Integrationsintervall.

Jährliche mittlere Tagesmitteltemperatur in Deutschland 1881 bis 2022

C Mit dem Integral lässt sich der Mittelwert bei einer sich kontinuierlich verändernden Größe berechnen, z. B. die mittlere Tagestemperatur aus einer aufgezeichneten Temperaturkurve.

Schmidt, G, Körner, H., Lergenmüller, A. (Hrsg.) (2011). Mathematik Neue Wege. Arbeitsbuch für Gymnasien, Analysis II. Braunschweig: Westermann, Schroedel, Diesterweg, Schöningh, Winklers, S. 162

Einzelwerte

Mittelwert 1881-1910

Linearer Trend

6

Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Auf dem Weg zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Anschauliche Überlegung

O. B. d. A. verlaufe der Graph von f im Intervall I oberhalb der x -Achse und es sei $h > 0$ mit $a \in I$ und $x + h \in I$.

Die Differenz $I_a(x+h) - I_a(x)$ entspricht dem Inhalt des **schraffierten Rechtecks**. Es hat die Breite h und näherungsweise die Höhe $f(x)$, d. h.:

$$I_a(x+h) - I_a(x) \approx f(x) \cdot h$$

Für $h \rightarrow 0$ konvergiert also $\frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h}$ gegen $f(x)$.

Auf dem Weg zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Behauptung: Die Ableitung der Integralfunktion ist die Berandungsfunktion / Integrandenfunktion.

Begründung

- Der absolute Zuwachs von I_a , das Flächenstück $I_a(x+h) - I_a(x)$, lässt sich durch Rechteckflächen abschätzen:

$$f(x) \cdot h \leq I_a(x+h) - I_a(x) \leq f(x+h) \cdot h$$

- Für den relativen Zuwachs von I_a (mittlere Änderungsrate $\frac{\Delta I_a}{h}$) folgt:

$$f(x) \leq \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h} \leq f(x+h) \quad (*)$$

- Die Integralfunktion I_a hat an der Stelle x die Eigenschaft $I'_a = f$, wenn $f(x+h)$ für $h \rightarrow 0$ gegen $f(x)$ strebt (d. h. f stetig in x ist). Dann folgt aus (*):

$$f(x) \leq \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h}}_{I'_a(x)} \leq f(x) \Rightarrow I'_a(x) = f(x)$$

Auf dem Weg zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Behauptung: Die Ableitung der Integralfunktion ist die Berandungsfunktion / Integrandenfunktion.

Begründung

- Der absolute Zuwachs von I_a , das Flächenstück $I_a(x+h) - I_a(x)$, lässt sich durch Rechteckflächen abschätzen:

$$\min(f(x), f(x+h)) \cdot h \leq I_a(x+h) - I_a(x) \leq \max(f(x), f(x+h)) \cdot h$$

- Für den relativen Zuwachs von I_a (mittlere Änderungsrate $\frac{\Delta I_a}{h}$) folgt:

$$\min(f(x), f(x+h)) \leq \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h} \leq \max(f(x), f(x+h)) \quad (*)$$

- Die Integralfunktion I_a hat an der Stelle x die Eigenschaft $I'_a = f$, wenn $f(x+h)$ für $h \rightarrow 0$ gegen $f(x)$ strebt (d. h. f stetig in x ist). Dann folgt aus (*):

$$f(x) \leq \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{I_a(x+h) - I_a(x)}{h}}_{I'_a(x)} \leq f(x) \Rightarrow I'_a(x) = f(x)$$

Auf dem Weg zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

m := Kleinster Funktionswert
von f im Intervall $[x; x + h]$

$$m \cdot h \leq I_a(x + h) - I_a(x) \leq M \cdot h$$

M := Größter Funktionswert
von f im Intervall $[x; x + h]$

Vorstellung

Wenn man die von f berandete Fläche mit Farbe streicht und dabei gleichmäßig von a nach rechts läuft, dann ist der Verbrauch an Farbe proportional zum Funktionswert von f an der Stelle, an der man sich gerade befindet.

1. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI 1)

Ist $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf einem Intervall I stetige Funktion und $a \in I$.

Dann ist die Integralfunktion I_a auf I differenzierbar und sie ist eine Stammfunktion von f , d.h. es gilt:

$$I'_a(x) = f(x)$$

Kurz: Die Integralfunktion ist eine Stammfunktion der Integrandenfunktion (Berandungsfunktion).

Bemerkungen

- HDI 1 kann nur durchschaut werden, wenn Stetigkeit, Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit inhaltlich verstanden wurden.
- Schulische Bedeutung des HDI:
  - (1) Der HDI zeigt einen Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren (HDI 1).
  - (2) Der HDI stellt ein Instrument zur Berechnung von Integralen zur Verfügung (HDI 2).

2. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI 2)

Sei $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf einem Intervall I **stetige** Funktion und F eine **Stammfunktion** von f .

Dann gilt für alle $a, b \in I$:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Bemerkung: HDI 2 kann aus HDI 1 gefolgert werden.

Nach HDI 1 gilt $I'_a(x) = f(x)$, die Integralfunktion ist bei stetiger Integrandenfunktion f eine Stammfunktion von f .

$I_a(x)$ unterscheidet sich von einer beliebigen Stammfunktion F von f nur durch eine additive Konstante c , d. h. $F(x) = I_a(x) + c$ für alle $x \in I$.

Einsetzen von a und b ergibt:

$$(I) \quad F(a) = I_a(a) + c = c$$

$$(II) \quad F(b) = I_a(b) + c \stackrel{(I)}{=} I_a(b) + F(a)$$

Daraus folgt:

$$\int_a^b f(x) dx = I_a(b) \stackrel{(II)}{=} F(b) - F(a)$$

Differenzieren und Integrieren als Umkehroperationen

7

Grundvorstellungen vernetzen

Wasserhahn-Applet 1: Grundvorstellungen vernetzen

- Gitternetz
- Beschriftung

Zeit: $x = 5$ s

Start

Wasserhähne

Wasserhahn-Applet 2: Grundvorstellungen vernetzen

f in l/s **Zuflussrate f in l/s**

- Gleichungen
- Gitternetz
- Beschriftung

$$F'(x) = f(x)$$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

Zeitpunkt $x = 3.13$ s

Hahn

orientierter Flächeninhalt F in l

$$F(3.13) = \int_0^{3.13} f(t) dt = 4.24$$

Wasservolumen F in l

- Fkt. 1
- Fkt. 2
- Fkt. 3
- Fkt. 4

Steigung F' in l/s

$$f(3.13) = 1.74$$

Becher, A. & Ossmann, H. (2016). Mit Wasserhahn-Applets zur Integralrechnung – Grundvorstellungen vernetzt in fünf Bildern. *Mathematik lehren*, 199, 33-36

GeoGebra-Buch: Mit Wasserhahn-Applets zur Integralrechnung
<https://geogebra.org/m/dzg7waaf>

Wasserhahn-Applet 3: Grundvorstellungen vernetzen

- Gleichungen
- Gitternetz
- Beschriftung

- Fkt. 1
- Fkt. 2

GeoGebra-Buch: Mit Wasserhahn-Applets zur Integralrechnung
<https://geogebra.org/m/dzg7waaf>

Integralbegriff: Inhaltliche Aspekte und Vorstellungen

menti.com/f2c8e8/2

Mentimeter

Was wünschen Sie sich für die Veranstaltung?

Wir empfehlen kurze Antworten. Sie haben noch 250 Zeichen frei. 250

Sie können mehrere Antworten eingeben

Absenden

Powered by Mentimeter [Terms](#)

Umfragen: Veranstaltungsfeedback

- <http://feedback.roth.tel>

Fragen (Es sind mehrere Antworten möglich.)

- Was fanden Sie an der Veranstaltung gut?
Freitext (jeweils maximal 250 Zeichen)
- Was wünschen Sie sich für die Veranstaltung?
Freitext (jeweils maximal 250 Zeichen)

Kontakt

Prof. Dr. Jürgen Roth & Dr. Susanne Digel

RPTU

Rheinland-Pfälzische Technische Universität
Kaiserslautern-Landau

Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen)

Fortstraße 7, 76829 Landau

j.roth@rptu.de; s.digel@rptu.de

juergen-roth.de

dms.nuw.rptu.de/mategnu

RPTU